

Pluie mêlée de neige ce samedi matin. Il fallait être diablement motivé, et sans doute un peu masochiste, pour quitter la tiédeur de la couette pour partir à la recherche d'hypothétiques champignons. La présidente et son vice-président s'étant fait porter pâles, prétextant la tenue (bien au chaud) d'une assemblée générale de la FME, nous nous sommes finalement retrouvés à 5 courageux pour affronter les éléments dans les bois de Chèvremont. Notons que deux nouveaux adhérents, Dominique et Pierre, font partie de l'expédition. Bienvenue à eux !

Ces bois de Chèvremont font l'objet d'une sortie chaque année à cette époque pour notre association. En effet, alors que les grandes forêts de feuillus du nord du département sont encore pauvres en espèces printanières, le sol calcaire et les pins sylvestres qui y poussent forment un milieu propice à la pousse de champignons assez peu connus et parfois spectaculaires.

Cette sortie ne restera pas dans les annales. Nous y sommes sans doute allés un peu trop tôt, certaines espèces emblématiques de cette station n'étant pas encore sorties.

Quelques belles découvertes cependant :

Dissingia leucomelaena:




Telle que nous l'avons trouvée



Etat adulte avancé

Spécifique du pin cette espèce est une printanière précoce. Les Dissingia sont des cousines très proche des Helvelles, elles ne s'en distinguent que par l'absence de crochet sous les asques. Cette espèce a eu comme nom de famille successivement Peziza, puis Acetabula, puis Helvella et enfin Dissingia Un long parcours...en attendant la suite.

Rhizocybe vermicularis



Les Rhizocybes ont été détachés des Clitocybes à la suite d'analyse phylogénétiques, mais en ont toutes les caractéristiques ; spores blanches, chapeau en entonnoir, lames décurrentes, chair élastique, couleur terne. Macroscopiquement, ils sont caractérisés par la présence de cordons mycéliens très visibles, d'où leur nom. Ce sont en général des espèces printanières.

R. vermicularis est spécifique des conifères et possède des spores particulièrement petites.

Citons aussi la récolte de deux espèces spécifiques mais courantes des cônes de pin : le cure oreilles (*Auriscalpium vulgare*) et la collybie des cônes de pin (*Strobilurus tenacellus*).



Strobilurus tenacellus

En regagnant les voitures nous avons eu la chance de découvrir une belle station de *Sclerotinia tuberosa*, au milieu des Anémones sylvie dont elles parasitent les racines. C'est un champignon fréquent, mais difficile à voir, caché qu'il est dans les tapis d'anémones. Il possède un sosie poussant sur les racines des ficaires et qu'on trouve également en ce moment autour de Belfort : *Sclerotinia binucleata*.



Quoique réalisée dans des conditions difficiles, cette sortie s'est déroulée dans la bonne humeur et nous a donc finalement permis de dénicher quelques belle espèces.

Un jeu pour terminer : au lieu du traditionnel « quel ce champignon ? » voici « quel sont ces cueilleurs ? » (ce n'est pas Marie-Delle, elle est cachée derrière son appareil photo)



Sur la page suivante vous trouverez la liste des espèces recensées au cours de cette sortie ainsi que celles apportées à la réunion d'identification du lundi soir

Nom commun	Nom valide	Nom vernaculaire
Chèvremont	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd, 1921	Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante
Chèvremont	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.) Singer, 1962	Collybie tenace
Chèvremont	<i>Schizophyllum commune</i> Fr., 1815	Schizophylle commun
Chèvremont	<i>Rhizocybe vermicularis</i> (Fr.) Vizzini, P.Alvarado, G.Moreno & Consiglio, 2015	
Chèvremont	<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys, 2013	
Chèvremont	<i>Phylloporia ribis</i> (Schumach.) Ryvarden, 1978	Polypore du groseillier
Chèvremont	<i>Phellodon niger</i> (Fr.) P.Karst., 1881	Hydne noir
Chèvremont	<i>Lophodermium pinastri</i> (Schrad.) Chevall., 1826	Rouge cryptogamique des pins
Chèvremont	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P.Karst., 1871	
Chèvremont	<i>Dumontinia tuberosa</i> (Bull.) L.M.Kohn, 1979	
Chèvremont	<i>Dissingia leucomelaena</i> (Pers.) K.Hansen & X.H.Wang, 2019	Helvelle blanche et noire
Chèvremont	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray, 1821	Hydne cure-oreille
Belfort	<i>Cyathicula amenti</i> (Batsch) Baral & R.Galán, 2013	
Belfort	<i>Disciotis venosa</i> (Pers.) Arnould, 1893	Pezize veinée
Belfort	<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P.Kumm., 1871	Entolome en bouclier
Belfort	<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	Lathrée écailleuse, Clandestine écailleuse
Belfort	<i>Tulostoma brumale</i> Pers., 1794	
Belfort	<i>Uromyces ficariae</i> (Schumach.) Lév., 1860	
Évette-Salbert	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quéf., 1886	Oreille de Judas
Évette-Salbert	<i>Sarcoscypha austriaca</i> (Beck ex Sacc.) Boud., 1907	
Auxelles-Bas	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P.Karst., 1879	Tramète brûlée
Auxelles-Bas	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach., 1810	
Auxelles-Bas	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P.Kumm., 1871	Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé,
Auxelles-Bas	<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl., 1896	
Auxelles-Bas	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor, 1836	
Auxelles-Bas	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke, 1879	
Auxelles-Bas	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., 1800	Stérée hirsute
Auxelles-Bas	<i>Tremella mesenterica</i> Retz., 1769	Trémelle mésentérique
Auxelles-Bas	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) Ryvarden, 1972	Tramète lilas
Auxelles-Bas	<i>Usnea hirta</i> (L.) F.H.Wigg., 1780	